

Tabela 1. Przyżyciowe wyniki tuczu w grupach z udziałem probiotyków EM (D) lub bez (K) i różnym źródłem białka (soja, bobowate)

Wyszczególnienie	Badane grupy					
	K			D		
	K	D-1	D-2	K	D-1	D-2
Liczba zwierząt,	n					
-na początku	25	25	25	25	25	25
-na końcu	23	25	25	24	23	24
Masa ciała,	kg					
-na początku tuczu	30,84	31,24	31,76	30,92	31,98	30,56
-na końcu I fazy tuczu	70,61	75,06	73,58	70,87	74,75	73,68
-na końcu tuczu (przy uboju)	109,72	112,98	112,82	112,73	114,18	115,88
Dni tuczu,	dni					
-w I fazie	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
-w II fazie	41,65	41,12	43,24	43,21	40,68	40,20
-w całym tuczu	87,65	87,12	89,24	89,21	86,68	86,20
Przyrosty dobowe,	g					
-w I fazie	864	953	909	869	929	936
-w II fazie	955	946	923	978	970	1053
-w całym tuczu	908	947	916	922	954	993
Zużycie paszy w całym okresie tuczu,	kg/kg					
	3,21	2,99	3,15	3,02	2,95	2,92